

## **Sessualità in puerperio e igiene intima: il ruolo del ginecologo**

Graziottin A. Rovei V.

### **Sessualità in puerperio e igiene intima: il ruolo del ginecologo**

Graziottin A. (Guest Ed.), I disturbi sessuali femminili: quando il medico conta  
Giornale Italiano di Ginecologia, Vol. XXVIII - n. 6, giugno 2006, p. 301-312

La vita sessuale della donna e della coppia cambia soprattutto dopo il primo figlio, e dipende da eventuali disturbi sessuali prima della gravidanza, dal tipo di parto (taglio cesareo, parto spontaneo o operativo, con o senza episiotomia o lacerazioni), dall'allattamento al seno. Le variabili influenzate sono il tempo intercorso tra il parto e la ripresa dei rapporti, nonché i parametri relativi a desiderio, eccitazione, orgasmo, dispareunia e dolore perineale.

L'igiene intima della donna nel post-partum svolge un ruolo importante nel riequilibrare la flora ed il pH vaginale.

L'estratto di *Thymus vulgaris*, utilizzato nell'igiene intima 1 o 2 volte/die per 4 settimane, riduce significativamente la presenza di sintomi vulvovaginali quali prurito, bruciore, edema, eritema, leucorrea. Questo si associa a significativo miglioramento del desiderio, dell'eccitazione e dell'orgasmo, e a significativa riduzione della dispareunia.

**Per gentile concessione di CIC Edizioni Internazionali**