

History of abuse and its relationship to pain experience and depression in women with chronic pelvic pain

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica
H. San Raffaele Resnati, Milano

As-Sanie S, Clevenger LA, Geisser ME, Williams DA, Roth RS.

History of abuse and its relationship to pain experience and depression in women with chronic pelvic pain

Am J Obstet Gynecol. 2014 Apr; 210 (4): 317.e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2013.12.048. Epub 2014 Jan 8

Studiare **l'impatto dell'abuso fisico o sessuale sulla percezione del dolore e sui sintomi depressivi nelle donne affette da dolore pelvico cronico** (Chronic Pelvic Pain, CPP): è questo l'obiettivo della ricerca di S. As-Sanie e collaboratori, dei dipartimenti di Ostetricia e Ginecologia, Psicologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, e Anestesiologia dell'Università del Michigan ad Ann Arbor, Stati Uniti.

Lo studio è stato condotto su **273 donne** rivoltesi per una valutazione clinica a un centro di riferimento di terzo livello. La storia di **abuso fisico o sessuale** (avvenuto nell'infanzia, nell'adolescenza o nell'età adulta), la **severità del dolore**, la **disabilità da dolore** e i **sintomi depressivi** sono stati accertati attraverso la compilazione, da parte di tutte le partecipanti, di questionari standardizzati. Le donne abusate sono state raggruppate per tipologia di abuso e confrontate con quelle non abusate.

Questi i risultati:

- dopo la normalizzazione dei dati per età e livello culturale, nessuna delle categorie di abuso risulta correlata in misura statisticamente significativa con **l'intensità del dolore pelvico cronico**;
- l'abuso sessuale subito nell'adolescenza o nell'età adulta è invece predittivo di **una maggiore disabilità legata al dolore** (OR 2.39; 95% CI, 1.05-5.40);
- sia l'abuso fisico che l'abuso sessuale, subiti nell'adolescenza o in età adulta, sono associati a **più elevati livelli di depressione** (per entrambi, $P < .05$);
- il livello di cultura è significativamente associato all'**intensità del dolore**, alla **disabilità correlata al dolore** e alla **depressione**.