

Dopo un cancro pediatrico: la menopausa iatrogena accresce il rischio di sindrome metabolica

Prof.ssa Alessandra Graziottin
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica
H. San Raffaele Resnati, Milano

Commento a:

Netterlid A, Mörse H, Giwercman A, Henic E, Åkesson KE, Erfurth EM, Elfving M.

Premature ovarian failure after childhood cancer and risk of metabolic syndrome: a cross-sectional analysis

Eur J Endocrinol. 2021 May 21;185(1):67-75. doi: 10.1530/EJE-20-1275

Valutare le correlazioni fra menopausa iatrogena e sindrome metabolica nelle donne sopravvissute a un cancro in età pediatrica: è questo l'obiettivo dello studio osservazionale trasversale di Axel Netterlid e collaboratori, dell'Università di Lund, Svezia. Al lavoro hanno collaborato i dipartimenti di Pediatria, Medicina riproduttiva, Scienze cliniche ed Endocrinologia, e le sedi accademiche distaccate a Helsingborg e Malmö.

Lo studio è stato condotto su **167 donne**, di età mediana pari a 34 anni (19-57), alle quali il cancro era stato diagnosticato all'età mediana di 8.4 anni (0.1-17.9), e su **164 controlli** analoghi per età, etnia, residenza e abitudini di fumo. Il tempo mediano dalla diagnosi era di 25 anni (12-41).

Sono stati raccolti dati su:

- glicemia a digiuno, insulinemia, emoglobina glicata e profilo lipidico;
- peso corporeo e massa grassa;
- farmaci assunti con regolarità;
- terapie ricevute per il tumore.

Questi, in sintesi, i risultati:

- la **menopausa iatrogena** era presente nel 13% (22/167) dei casi (escludendo le cause ipotalamiche e ipofisarie) e in nessuno dei controlli;
- la **sindrome metabolica** era presente nel 14% (24/167) dei casi totali ($P = 0.001$), nel 23% (5/22) di quelli in menopausa iatrogena ($P < 0.001$) e solamente nel 4% (6/164) dei controlli;
- l'**OR per la sindrome metabolica** era 4.4 nei casi totali rispetto ai controlli (95% CI: 1.8 - 11.1) ($P = 0.002$) e 7.7 in quelli in menopausa iatrogena (CI: 2.1 - 28.1) ($P = 0.002$).

In conclusione:

- la sindrome metabolica è nettamente **più prevalente** nelle donne curate per un cancro in età pediatrica;
- la condizione di menopausa iatrogena, provocata dalle cure oncologiche, **accresce ulteriormente** questo rischio;
- è quindi opportuno **monitorare costantemente** questa categoria di pazienti per prevenire l'insorgenza della sindrome metabolica e dei rischi, cardiovascolare in primis, ad essa associati.