

Flussi abbondanti e dolore mestruale: piÃ¹ frequenti nelle donne con patologie reumatiche

Prof.ssa Alessandra Graziottin
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica
H. San Raffaele Resnati, Milano

Commento a:

Orlandi M, Vannuccini S, El Aoufy K, Melis MR, Lepri G, Sambataro G, Bellando-Randone S, Guiducci S, Marco Cerinic M, Petraglia F.

Menstruation-related disorders – dysmenorrhea and heavy bleeding – as significant epiphenomena in women with rheumatic diseases

Front Pharmacol. 2022 Feb 4;13:807880. doi: 10.3389/fphar.2022.807880

Valutare la prevalenza di disturbi correlati alle mestruazioni nelle donne in et  fertile affette da patologie reumatiche:   questo l'obiettivo dello studio coordinato da Martina Orlandi e Felice Petraglia, e al quale hanno preso parte la Divisione di Reumatologia e il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze) e l'Unit  di Immunologia, reumatologia, allergie e malattie rare dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

Lo studio   stato condotto su **200 pazienti** attraverso la compilazione di un questionario validato su anamnesi ginecologica, regolarit  del ciclo, sintomi mestruali e qualit  di vita. Le partecipanti sono poi state confrontate con 305 controlli di et  equivalente.

Le donne affette da patologie reumatiche soffrivano di artrite (58%), malattie del tessuto connettivo (40%) e vasculite sistemica (1.5%). Dall'analisi dei dati   emerso che, rispetto ai controlli, esse riportavano con pi  frequenza:

- **flussi mestruali emorragici** sia durante l'adolescenza (51.7 vs 25.4%, rispettivamente; $p = .0001$), sia durante la vita adulta (37.7 vs 25.9%; $p = .0065$);
- **dismenorrea** durante l'adolescenza (55.6 vs 45.4%; $p = .0338$);
- **varie forme di dolore** (dismenorrea, dolore pelvico non mestruale, dispareunia, disuria e dischezia) ($p = .0001, .0001, .0001, .0001, .0002$, rispettivamente).

Inoltre:

- fra le donne che riportavano sintomi reumatici da moderati a severi, la **dismenorrea** e la **dispareunia** risultavano significativamente pi  frequenti rispetto ai controlli ($p = .0001$; $p = .0022$, rispettivamente);
- i **punteggi di qualit  di vita** erano significativamente pi  bassi fra le donne con patologie reumatiche, sia nei domini fisici ($p = .0001$) che in quelli mentali ($p = .0014$) del 12-Item Short Form Survey;
- i dati non evidenziano sostanziali scostamenti fra le diverse patologie reumatiche, ad eccezione del fatto che le donne con malattie del tessuto connettivo presentano pi  spesso **una storia familiare di mestruazioni emorragiche** ($p < .01$).

In conclusione:

- le donne affette da patologie reumatiche soffrono sovente di disturbi ginecologici, e in particolare mestruali;
- in sede di **visita reumatologica**   quindi importante chiedere alla donna se soffre di sintomi

ginecologici e, in caso affermativo, indirizzarla al ginecologo per una valutazione accurata;
- è importante **indagare le ragioni fisiopatologiche** delle correlazioni osservate in questo studio, tanto piÃ¹ che alcuni dei sintomi emersi (flussi emorragici, dismenorrea, dispareunia profonda) sono anche **altamente suggestivi di endometriosi**.